

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-231/2015d
z dnia 26.03.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-180/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, 01-748 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99.

MAXIM STAR 025 FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

- **cyprokonazol** (związek z grupy triazoli) – 6,3 g/l (0,60%),
- **fludioksonil** (związek z grupy fenylopiroli) – 18,8 g/l (1,79%).

**Zezwolenie MRiRW nr R- 180/2012 z dnia 20.12.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-231/2015d z dnia 26.03.2015 r.**



H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

P201- przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności

P202- Nie używać przez zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa

P 391 - Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu kontaktowym i układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego jęczmienia ozimego i jarego oraz owsa, w celu zwalczania chorób grzybowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

1. JĘCZMIENŃ OZIMY

Pleśń śniegowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 800 ml/100 kg ziarna.

2. JĘCZMIENŃ OZIMY, JĘCZMIENŃ JARY

Głównia pyłaca, pasiastość liści, zgorzel siewek, plamistość siatkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 800 ml/100 kg ziarna.

3. OWIES

Głównia pyłaca, zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 800 ml/100 kg ziarna.

UWAGI:

1. Zaprawianie ziarna chroni liście jęczmienia jarego przed plamistością siatkową do początku fazy strzelania w źdźbło.
2. Jesienią zaprawianie ziarna jedynie ogranicza występowanie plamistości siatkowej w jęczmieniu ozimym.
3. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
4. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
5. Zaprawionego materiału siewnego można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
6. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
7. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
8. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
9. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA

Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.

Zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą użytkową.

Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY

Z resztkami zawiesiny oraz wodą użytą do zaprawiarki należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- zużyć do sporządzania zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar na którym zastosowania środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji).

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz).

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
- po zamknięciu

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0°C-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii –