

Fungicyd o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego



BLUNA
synthos
AGRO **250 EC**

FUNGICYD

**PASJA WIEDZA
DOŚWIADCZENIE**

Bluna 250EC

FUNGICYD o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ: difenokonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l (23,64%).

STOSOWANIE ŚRODKA:

Rzepak ozimy - czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Jabłoń - parch jabłoni.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo co 10 - 14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).

Wiśnia - drobna plamistość liści drzew pestkowych.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 71-78).

STOSOWANIE ŚRODKA W UPRAWACH I ZASTOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH:

Grusza - parch gruszy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo co 10 - 14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).

Czereśnia - drobna plamistość liści drzew pestkowych.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 71-78). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym.

Marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew - alternarioza, mączniak prawdziwy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choro-

by, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).

Topinambur - zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem.

Rzepa, brukiew - alternarioza.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).

Burak ćwikłowy - rdza buraka.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).

Róża uprawiana w polu - mączniak prawdziwy, rdza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): rzepak ozimy – 74 dni; jabłoń, wiśnia, grusza, czereśnia – 28 dni; marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, rzodkiew, chrzan, topinambur, salsefia, rzepa, brukiew, burak ćwikłowy – 14 dni; róża (uprawiana w polu) – nie dotyczy.

