

# Pixxaro™

HERBICYD

ARYLEX™ ACTIVE



# Pixxaro™ zapewnia relaks.



Dow AgroSciences


*Solutions for the Growing World*



# Rolnik – świadomy producent

## Jesteś rolnikiem i producentem zbóż:

- ✓ Uprawiasz zboża i chcesz za swoją pracę uzyskać jak najwięcej korzyści.
- ✓ Podchodzisz racjonalnie do zwalczania chwastów. Stosujesz zabiegi jesienne, licząc się z tym, że niektóre gatunki będą wymagały wiosennych zabiegów poprawkowych.
- ✓ Zarządzając swoim gospodarstwem, dokładnie planujesz harmonogram prac – zwłaszcza wczesną wiosną.



## Wiosna jest najbardziej pracowitą porą roku. Właśnie wtedy pojawiają się liczne problemy, z którymi co roku mierzysz się w swojej pracy:

- ✓ Kapryśna pogoda i niskie temperatury powodują zmianę planów i skumulowanie się prac w Twoim kalendarzu. Nadmiar niezaplanowanej pracy wpływa na Ciebie stresująco i dezorganizująco. Zabiegi wykonane w nieodpowiednich warunkach temperaturowych mogą się okazać nieskuteczne, co wiąże się z kolejnymi wydatkami i dodatkową pracą.
- ✓ Niektóre gatunki chwastów, dotychczas traktowane jako mało istotne dla wysokości i jakości plonów, swobodnie się rozprzestrzeniają, stając się poważnym zagrożeniem dla zbóż.

Nie jesteś w stanie zapanować nad pogodą i wieloma innymi czynnikami. Czy zatem podczas planowania wczesnowiosennych prac polowych możesz uniknąć nadmiaru stresu?



# Rozwiązanie jest proste – **Pixxaro™**

**Pixxaro™** to pierwszy na rynku, rewolucyjny herbicyd zawierający **Arylex™ Active** – najnowszą substancję biologicznie czynną. To dzięki niemu rozwiążesz swoje dotychczasowe problemy:

- ✓ Rozpoczniesz wczesnowiosenne prace z wyprzedzeniem, a w sytuacji wystąpienia niskich temperatur nie będziesz musiał przerywać zabiegów.
- ✓ Zyskasz kontrolę nad szerokim spektrum kluczowych chwastów dwuliściennych występujących powszechnie po zabiegach jesiennych.
- ✓ Zwalczysz chwasty rozprzestrzeniające się na polu bez ograniczeń pomimo stosowania dotychczasowych rozwiązań.

**Unikalny skład Pixxaro™ zapewnia szereg korzyści, które dotychczas wydawały się być poza zasięgiem!**



Osiągniesz wysoką skuteczność działania, pracując nawet przy **2°C**.

Nie zmieniaj planów, spiętrzenie prac Cię nie dotyczy! Nagłe spadki temperatury nie są już przeszkodą w wykonywaniu zabiegów zwalczających chwasty.



**Oszczędzisz czas, wodę i paliwo.**

Podczas wczesnej aplikacji możesz użyć tylko 100–150 l wody na hektar zamiast zwyczajowych 200 l/ha. Umożliwi to opryskanie dodatkowych 30–100% powierzchni więcej, przy jednym napełnieniu opryskiwacza.



Wykonasz zabieg nawet **godzinę** przed deszczem.

Dzięki natychmiastowemu działaniu i szybkiemu pobraniu przez chwasty niespodziewany deszcz nie spowoduje zmniejszenia skuteczności zabiegu.



**Obniżysz koszty.**

Jeśli zaczniesz odpowiednio wcześniej, chwasty będą w niskich fazach rozwojowych, a dzięki temu wystarczy mniejsza dawka **Pixxaro™**, by je zwalczyć.




Zaczniesz opryskiwanie nawet **2–3 tygodnie** przed standardowym terminem aplikacji herbicydów, co dodatkowo pomoże Ci efektywnie kontrolować chwasty szybko przechodzące do fazy generatywnej (kwitnienia), np. jasnoty, gwiazdnica pospolita.



**Zyskasz większe plony.**

Wczesne wyeliminowanie chwastów z pól umożliwi optymalny rozwój roślinom uprawnym.



**Nie będziesz miał ograniczeń** w doborze roślin następczych.



Przejmiesz **kontrolę nad populacją chwastów** dwuliściennych mało wrażliwych na dotychczas używane rozwiązania.

# Pixxaro™ – szczegóły stosowania

## W jakich zbożach stosować Pixxaro™?

- ✓ Ozime: pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime.
- ✓ Jare: pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare (oprócz owsa).


## W jakim terminie można uzyskać optymalne efekty?

- ✓ zwalczając wszystkie chwasty – przeprowadź zabieg w fazie kilku liści właściwych chwastów
- ✓ zwalczając przytulię czepną – możesz przeprowadzić zabieg niezależnie od jej fazy rozwojowej
- ✓ w celu skutecznego zwalczenia bodzisków zabieg należy wykonać na chwasty w niskich fazach rozwojowych (do 10 cm). Przy nasileniu bodzisków do 30 szt./m<sup>2</sup> dawka Pixxaro™ to: 0,375 l/ha, przy większym nasileniu należy zastosować dawkę 0,5 l/ha

### Zalecane dawkowanie:

Zboża ozime i jare (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto).

**Pixxaro™ dawka 0,25–0,5 l/ha**



- ✓ **0,375 l/ha** – najkorzystniej!
- ✓ **0,5 l/ha** – przy dużym nasileniu bodziszka i zwalczaniu np. chabra bławatka
- ✓ **0,25 l/ha** – sporządzając mieszaniny z innymi herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne w celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów

# Sprawdź, nad którymi chwastami przejmiesz pełną kontrolę!

**Zakres zwalczanych chwastów oraz stopień skuteczności uzyskiwany w doświadczeniach w Polsce i w Europie (do fazy 2. kolanka zbóż, BBCH 32).**

| Chwasty                  | Pixxaro™ 0,375 l/ha | Pixxaro™ 0,5 l/ha |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Ambrozja bylicolistna*   | ● ●                 | ● ● ●             |
| Bodziszek drobny*        | ● ● ●               | ● ● ●             |
| Bodziszek okrągłolistny* | ● ● ●               | ● ● ●             |
| Bodziszek porożcinany*   | ● ● ●               | ● ● ●             |
| Chaber bławatek*         | ● ●                 | ● ● ●             |
| Dymnica pospolita        | ● ● ●               | ● ● ●             |
| Gwiazdnica pospolita     | ● ● ●               | ● ● ●             |
| Jasnota purpurowa        | ● ● ●               | ● ● ●             |
| Jasnota różowa           | ● ● ●               | ● ● ●             |
| Komosa biała             | ● ● ●               | ● ● ●             |
| Mak polny*               | ● ●                 | ● ● ●             |
| Poziewnik szorstki*      | ● ●                 | ● ● ●             |
| Przytulia czepna         | ● ● ●               | ● ● ●             |
| Rdest ptasi*             | ● ●                 | ● ● ●             |
| Rdestówka powojowata     | ● ●                 | ● ● ●             |
| Tasznik pospolity        | ● ●                 | ● ● ●             |

Skuteczność: ● ● ● chwasty wrażliwe, ● ● chwasty średnio wrażliwe

\* Opryskiwać na chwasty znajdujące się w małych fazach rozwojowych (do kilku liści właściwych).



**Pixxaro™** może być stosowane z wieloma herbicydami, fungicydami, preparatami regulującymi pokrój, a także z siarczanem magnezu.

Dzięki temu możesz rozszerzać spektrum zwalczanych chwastów jedno- i dwuliściennych, chronić plony przed chorobami grzybowymi lub regulować pokrój roślin w trakcie jednego zabiegu\*.

\* Nie należy łączyć Pixxaro™ z herbicydami zawierającymi fenoksaprop!

## Profil produktu

| Zawartość substancji aktywnych [g/l] | Arylex™ Active 12 g                                                                                        | Fluoksypyr 280 g |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Mechanizm działania wg HRAC          | 0                                                                                                          | 0                |
| Formulacja                           | płynna, EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej)                                                     |                  |
| Zakres stosowania                    | wszystkie gatunki oraz odmiany zbóż ozimych i jarych (oprócz owsa)                                         |                  |
| Termin aplikacji                     | wiosna, BBCH 13–45 (od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego zbóż) |                  |
| Zalecane dawki                       | 0,25–0,5 l/ha w zależności od zwalczanych chwastów i sposobu aplikacji lub partnera                        |                  |
| Zalecane temperatury stosowania      | 2–25°C                                                                                                     |                  |
| Odporność na zmywanie                | 1 godzina                                                                                                  |                  |
| Zalecana ilość wody                  | 100–400 l/ha                                                                                               |                  |
| Następstwo roślin                    | brak zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (patrz etykieta)                                          |                  |



**Dow AgroSciences**

Edycja: Rok 2018

®™ znak towarowy firmy The Dow Chemical Company („Dow”) lub spółki stowarzyszonej z Dow  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa  
tel. 22 548 73 00, fax 22 548 73 09  
e-mail: [fwrpols@dow.com](mailto:fwrpols@dow.com)  
internet: [www.dowagro.pl](http://www.dowagro.pl)