



SEALICIT®

PFC6 (B) NIEMIKROBIOLOGICZNY BIOSTYMULATOR ROŚLIN

Składniki

Wyciąg z wodorostów (CMC2)

Uprawy	Zalecana dawka (L/ha)	Typ aplikacji (Ilość cieczy)	Faza rozwojowa	Ilość zabiegów	Cel zabiegów
Rzepak Ozimy	1.0	Opрыsk nalistny (Ilość wody 200-300 L/ha)	BBCH16-BBCH55	1	Zwiększenie odporności luszczyn na pęknięcie

Warunki sprzedaży:

Stosować zalecaną dawkę. Produkt jest kompatybilny z wieloma środkami ochrony roślin. W przypadku mieszankiny użytkownik jest odpowiedzialny za przetestowanie mieszankiny przed jej zastosowaniem. Producent gwarantuje jedynie, że produkt jest zgodny z opisem na etykiecie. Nabywca i użytkownik zgadzają się przyjąć wszelką odpowiedzialność związaną z obchodzeniem się, użytkowaniem i utylizacją tego produktu. Żaden przedstawiciel ani dystrybutor nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek gwarancji wykraczających poza te zawarte w niniejszym dokumencie.

Zalecane warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym miejscu o temperaturze od 5 do 30°C. Produkt jest stabilny w temperaturze pokojowej. Produkt jest niepalny. Utrzymywać pojemniki w pozycji pionowej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
P270: Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas stosowania.

Data produkcji: patrz na opakowaniu Data ważności: 3 lata od daty produkcji	Numer serii:
5 L CIECZ	Brandon Bioscience, Brandon Products Ltd., Centrepont, Tralee, County Kerry, Ireland. www.brandonbioscience.com

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zalecenia dotyczące stosowania

Jeden pojedynczy zabieg nalistny SEALICIT® poprawia wskaźnik odporności na pęknięcie luszczyn rzepaku ozimego. Nasza zalecana dawka i czas stosowania to odpowiednio 1 l/ha (w 200-300 l wody na ha) i fazy rozwojowe rzepaku BBCH16-55 (od fazy 6 liści do momentu widocznych pojedynczych pąków kwiatowych, nadal zamkniętych). Dla wyższych ilości wody niż zalecane (tzn. ponad 300 l/ha) musi być stosowana odpowiednio wyższa dawka SEALICIT®. SEALICIT® nie powinien być stosowany w postaci nierozcieńczonej.

Uwagi dotyczące prawidłowego stosowania

SEALICIT® może być stosowany przez długi czas z wysoką skutecznością. Aplikacja SEALICIT® daje najlepsze rezultaty, gdy rośliny są suche a warunki sprzyjają wegetacji roślin (małe zachmurzenie, odpowiednia temperatura, dostępne składniki odżywcze i zaopatrzenie w wodę). Nie stosować SEALICIT®, jeśli spodziewany jest deszcz w ciągu 3-4 godzin. Nie stosować SEALICIT® bezpośrednio przed lub po nocnych przymrozkach, przy bardzo wysokich temperaturach w ciągu dnia i wysokich wahaniami temperatury pomiędzy nocą i dniem. Mieszaniny zbiornikowe zastosować natychmiast po przygotowaniu.

Mieszalność

Podczas stosowania mieszanin zbiornikowych należy przestrzegać ustalonych i zatwierdzonych zakresów zastosowania oraz przepisów dotyczących stosowania partnera do mieszanki. SEALICIT® miesza się z popularnymi fungycydami, takimi jak Mystic® 250 EW i insektycydami, takimi jak KaisoSorbie®. Możliwe są również mieszanki z regulatorami wzrostu. Przy stosowaniu roztworów saletrzano-mocznikowych (RSM) należy utrzymywać stosunek roztworów RSM na poziomie 1 do 4, tj. 1 część roztworu RSM na min. 4 części wody. Nie dodawać żadnych innych partnerów zbiornikowych do mieszanin zawierających azot. Odradzamy stosowanie mieszanek z fungycydami zawierającymi miedź oraz olejami/środkami zwilżającymi. Nie mieszać z niechelowanymi nawozami wapniowymi. Nie mieszać z wysoko kwaśnymi roztworami lub silnymi środkami utleniającymi. Należy unikać mieszanek o wartości pH poniżej 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za negatywne skutki niedozwolonych przez nas mieszanek.

Przygotowanie cieczy do oprysku i wykorzystanie resztek:

Przygotuj tylko tyle cieczy roboczej, ile jest faktycznie potrzebne i oblicz wymaganą ilość środka tak dokładnie, jak to możliwe. Szczególnie w przypadku opryskiwaczy z większymi zbiornikami zaleca się stosowanie przepływomierza podczas napełniania zbiornika z cieczą roboczą. Używaj odpowiedniej odzieży ochronnej i sprzętu podczas przygotowywania oprysku!

1. Napełnij zbiornik 1/3-1/2 wymaganą ilością wody.
2. Włącz mieszadło.
3. Przed wylaniem z opakowania energicznie wstrząśnąć SEALICIT®.
4. Wlać SEALICIT® do zbiornika przez sito filtracyjne lub do rozdwajniacza.
5. Ostrożnie wypłukać opróżnione opakowanie produktu i wylać popłuczyny do zbiornika opryskiwacza
6. Dopełnić zbiornik opryskiwacza wodą do wymaganej objętości
7. Opryskiwać tak dokładnie, jak to możliwe, natychmiast po zmieszaniu z uruchomionym mieszadłem.

Środki pierwszej pomocy

Informacje ogólne: Produkt jest uważany za produkt o niskim stopniu zagrożenia w normalnych warunkach użytkowania.

W RAZIE PÓŁKNIECIA: Dokładnie przepłukać usta wodą. Zwróć się o pomoc lekarską, jeśli objawy są ciężkie lub utrzymują się.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Spłukać wodą. Zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli podrażnienie utrzymuje się po umyciu.

Kontakt z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zwróć się o pomoc lekarską, jeśli jakiegokolwiek dyskomfort będzie się utrzymywał.

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy: W normalnych warunkach użytkowania nie przewiduje się szczególnych wymagań.

Uwagi dla lekarza, jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna i specjalne leczenie: Leczenie objawowe.

Uwagi dotyczące transportu, przechowywania i unieszkodliwiania

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu o temperaturze od 5 do 30°C. Produkt jest stabilny w temperaturze pokojowej. Produkt jest niepalny. Utrzymywać pojemniki w pozycji pionowej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Transport: Nie regulowane. Brak towarów niebezpiecznych.

Utylizacja: Nie wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Nie opróżniaj pozostałości do zlewu lub toalety. Zabrać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Opróżnione pojemniki należy zabrać do systemu zbiórki i recyklingu. Zawartość pojemnik należy usunąć zgodnie z przepisami krajowymi.

Odpowiedzialność

Podane informacje odpowiadają obecnemu stanowi naszej wiedzy i mają na celu dostarczenie informacji o preparacie i jego możliwych zastosowaniach. Jeśli przestrzegane są instrukcje użytkowania, preparat jest odpowiedni do zalecanych celów. Gwarantujemy, że skład produktu w zapieczętowanych oryginalnych opakowaniach odpowiada informacjom podanym na etykietach. Ponieważ przechowywanie i stosowanie biostymulatora roślin jest poza naszą kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją. Różnorodne czynniki, zarówno lokalne, jak i regionalne, takie jak warunki pogodowe i glebowe, odmiany roślin, data zastosowania, technika aplikacji, oporność, mieszanki z innymi produktami itp. mogą wpływać na działanie produktu. W niesprzyjających warunkach może to spowodować zmianę skuteczności produktu lub nie można wykluczyć uszkodzenia uprawy. Dystrybutor lub producent nie ponosi odpowiedzialności za takie konsekwencje. Wszelkie prawa własności, obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, a także postanowienia dotyczące zatwierdzenia produktu i informacji o produkcie muszą być przestrzegane przez użytkownika naszego produktu na własną odpowiedzialność. Wszystkie dane i informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zarejestrowany znak towarowy

SEALICIT® = Znak towarowy reg. Brandon Products Ltd.

Producent: Brandon Bioscience, Brandon Products Ltd., Centrepont, Tralee, County Kerry, Ireland, www.brandonbioscience.com

Dystrybucja: Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójcka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97, www.nufarm.pl