

PLONURAN®

I DUO

Stosować w razie konieczności, zgodnie z przeznaczeniem.
Nie przekraczać dawki stosowania.

Preparat nawozowy należy do PFC 1(C)(II)(a):
Prosty nieorganiczny nawóz mikroelementowy
zawierający jako składnik nieorganiczny mikroelement
Tlenochlorek miedzi: 62.5 % suchej masy CAS: 1332-65-6, CMC 1
Wodorotlenek miedzi: 23.3 % suchej masy CAS: 20427-59-2, CMC 1

Preparat zawiera 400 g Miedzi/L
Nawóz w rozumieniu przepisów rozporządzenia (EU) 2019/1009



Producent:
Cosaco GmbH
Singapurstrasse 1
20457 Hamburg
Germany

Dystrybutor:
Certis Belchim BV Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 214,
02-486 Warszawa
infolinia: +48 660 48 55 48
e-mail:
info.pl@certisbelchim.com



Nawóz **Zawartość: Netto 6,7 kg (= 5 Litr)**

UFI: AF2A-00GM-U00R-0QJ5

PLONURAN DUO
zawiera: miedź (Cu)

Działa szkodliwie po połknięciu. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w - środowisku wodnym. Przechowywać pod zamknięciem, z dala od dzieci, żywności, napojów i pasz. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę.

424955

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zakres stosowania nawozu

PLONURAN DUO likwiduje niedobory miedzi w roślinach. Nawóz przeznaczony jest do stosowania na plantacjach roślin uprawnych, które są wrażliwe na niedobór miedzi np. zboża, rzepak, kukurydza, buraki, ziemniaki, okopowe, motylkowe.

Dawki nawozu, sposób i terminy stosowania

W zależności od wrażliwości uprawianej rośliny na niedobór miedzi nawóz PLONURAN DUO stosuje się w dawkach od 0.25 do 2.4L / ha.

PLONURAN DUO powinien być stosowany w podanych niżej terminach i dawkach:

Gatunek roślin	termin stosowania	Zalecana dawka w l/ha
Zboża ozime i jare	Przed lub po wschodach zbóż do fazy drugiego kolanka	0,25-0,3
Rzepak ozimy	Jesienią lub wiosną	0,6
	od stadium 2 liści do początku kwitnienia	
Kukurydza	Po wschodach aż do fazy 8 liścia	0,6-1,2
Burak cukrowy	W okresie wegetacji aż do ostatniego oprysku przeciwko chwościkowi buraka	0,6-1,2
Ziemniaki	W okresie wegetacji aż do ostatniego oprysku przeciwko zarazie ziemniaka	0,6-1,2
Strączkowe	Przed siewem aż do zakończenia krzewienia	0,6-1,2
Warzywa	Po wchodach/wysadzeniu aż do ostatniego zabiegu fungicydowego	0,6-1,2
Łąki i pastwiska	Po wypasie jesienią aż do początku wegetacji	1,2-2,4

Nawożenie doglebowe lub dolistne wykonuje się w formie oprysków za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin.

Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha (100 l wody- w przypadku stosowania przed siewem).

PLONURAN DUO można stosować łącznie z innymi nawozami (poza siarczanami), jednak przed zastosowaniem należy wykonać test sprawdzający (z użyciem niewielkiej ilości), czy nie zachodzą niekorzystne reakcje (np. wytrącanie osadu, kłaczenie). Stosując łącznie z roztworem saletrzano mocznikowym należy najpierw zmieszać PLONURAN DUO z wodą, w stosunku 1:3, a dopiero później dodać RSM.

Sposób sporządzania cieczy roboczej

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu nawozu do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszało hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Przechowywanie nawozu

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżej 0° C, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed ciepłem oraz bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Opakowania jednostkowe nawozu przechowywać najwyżej w 4 warstwach.

Środki ostrożności

Przechowywać pod zamknięciem, z dala od dzieci, żywności, napojów i pasz. W czasie pracy z nawozem nie jeść, nie pić i nie palić. Zaleca się używanie ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i osłony twarzy. W przypadku kontaktu z oczami lub ze skórą przemyć je niezwłocznie dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.