

# NIKOSAR<sup>®</sup>


## Z GRUNTU **USUWA CHWASTY**



- Szybki w działaniu – zahamowuje wzrost chwastów zaraz po zastosowaniu
- Szerokie spektrum i skuteczność zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w tym perzu
- Działa układowo i selektywnie powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów
- 2 x mniejsza dawka w porównaniu z produktami posiadającymi formułą SC (2 L SC = 1 L OD)

# NIKOSAR®

060 OD



**NIKOSAR 060 OD** jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

**Dostępne wielkości opakowań: 1 l, 5 l, 10 l.**

### Zawartość substancji aktywnej:

nikosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 60 g/l (6,09%).

### DZIAŁANIE NA CHWASTY:

**NIKOSAR 060 OD** jest herbicydem selektywnym, o działaniu układowym pobieranym głównie poprzez liście i szybko przemieszczanym w roślinie, powodującym zahamowanie jej wzrostu i rozwoju. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

### ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI ŚRODKA:

Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i ich liczebności na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrosnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia. **Środek wygodny w stosowaniu dzięki niskiej dawce na 1 ha - formułacja 060 OD, 2 x mniejsza dawka w porównaniu z preparatami opartymi na 40 SC (2 L SC = 1 L OD).**

| UPRAWA                               | SKUTECZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                         | LICZBA ZABIEGÓW | MAKSYMALNA DAWKA | ZALECANA ILOŚĆ WODY | TERMIN STOSOWANIA                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kukurydza</b><br>(dawka 0,5 l/ha) | <b>Chwasty wrażliwe:</b><br>chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne                                | 1               | 0,5 l/ha         | 200-300 l/ha        | Zabieg wykonać wcześniej po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18) |
| <b>Kukurydza</b><br>(dawka 0,7 l/ha) | <b>Chwasty wrażliwe:</b><br>chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne | 1               | 0,7 l/ha         | 200-300 l/ha        | Zabieg wykonać wcześniej po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18) |
|                                      | <b>Chwasty średnio wrażliwe:</b><br>ostrożeń polny                                                                                                                                                                                                  | 1               | 0,7 l/ha         | 200-300 l/ha        |                                                                                |
|                                      | <b>Chwasty odporne:</b><br>rdest powojowy, rdest ptasi, przetacznik perski                                                                                                                                                                          |                 |                  |                     |                                                                                |

OKRES KARENCJI: brak.

### NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsięwziętej można uprawiać kukurydzę lub: zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach - na glebach obojętnych i zasadowych, rośliny strączkowe - po 9 miesiącach, lucernę - po 12 miesiącach. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

NIKOSAR

