



Torero® 500 SC

Przyszpili chwasty!



herbicyd – metamitron, etofumesat

ADAMA

Prawidłowo prowadzona plantacja buraków cukrowych ma obsadę ok. 9 szt. roślin na m². Chwastów może być zdecydowanie więcej.

Zachwaszczenie plantacji w wybranych badaniach. Polska 2007-2011 (różne lokalizacje).

Rok badania	Ilość chwastów szt./m ²	Ilość gatunków chwastów	Gatunki dominujące
2007	69	8	szarłat szorstki komosa biała maruna bezwonna
2008	61	5	komosa biała samosiewy rzepaku przytulia czepna
2009	162	16	komosa biała szarłat szorstki tobołki polne
2011	150	12	komosa biała przetacznik polny jasnota purpurowa

Burak cukrowy od momentu wschodów aż do fazy 6-8 liści rośnie znacznie wolniej niż konkurujące z nim chwasty. Brak kontroli nad ekspansją chwastów powoduje znaczne straty plonu. Niezbędne jest stosowanie herbicydów.

Systemy ochrony dawkami dzielonymi stosowanymi po wschodach chwastów są bardzo skuteczne tylko w zwalczaniu chwastów w fazie siewek.

Niezwykle ważny jest termin pierwszego zabiegu. Nawet jeden dzień opóźnienia może spowodować, że chwasty przerosną fazę największej wrażliwości i zastosowany środek ich nie zwalczy. Powodów opóźnienia zabiegu może być wiele; padający deszcz czy awaria opryskiwacza.

Ograniczenie takiego ryzyka jest możliwe dzięki użyciu herbicydów dogłębowych stosowanych po siewie, ale przed wschodami buraków.

Prawidłowo wykonany zabieg zabezpieczy plantację na kilka tygodni w tym najbardziej krytycznym dla buraków okresie.

Torero 500 SC:

- najlepszy początek ochrony herbicydowej buraków,
- dwa kierunki działania: przez korzenie oraz liście,
- maksymalna skuteczność na wszystkie najgroźniejsze chwasty,
- pełna elastyczność aplikacji.



Torero 500 SC – najlepszy początek ochrony herbicydowej buraków

Torero 500 SC w pierwszym zabiegu herbicydowym w uprawie buraka cukrowego niszczy wszystkie istotne chwasty przy jednoczesnym bezpieczeństwie chronionej uprawy.

Torero 500 SC stosowany przed wschodami buraków:

- zabezpiecza plantację przed chwastami już w momencie wschodów, kiedy:
 - buraki są najbardziej wrażliwe na zachwaszczenie,
 - buraki są najbardziej podatne na uszkodzenia i zahamowanie wzrostu przez herbicydy stosowane w technologiach powoschodowych,
 - jest największe ryzyko opóźnienia zabiegów nalistnych np. z powodu warunków pogodowych.


Torero 500 SC stosowany po wschodach buraków:

- zwalcza chwasty niezwalczane przez inne herbicydy,
- zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu.


Torero 500 SC – dwa kierunki działania: przez korzenie oraz liście

Torero 500 SC to synergizm działania dwóch substancji aktywnych, **metamitron 350 g/l** + **etofumesat 150 g/l**, o odmiennym mechanizmie działania.

Metamitron hamuje fotosyntezę zwalczanych chwastów. Pobierany jest głównie przez korzenie i transportowany w całej roślinie.



Etofumesat blokuje syntezę lipidów (tłuszczów), które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie komórek chwastów. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów.



Torero 500 SC – maksymalna skuteczność na wszystkie najgroźniejsze chwasty



komosa biała



przytulia czepna



psianka czarna



szarłat szorstki



przetacznik perski



jasnota purpurowa



fiolatek polny



gwiazdnica pospolita

Chwasty	Torero 500 SC
komosa biała	★ ★ ★
przytulia czepna	★ ★ ★
rdest powojowy	★ ★
szarłat szorstki	★ ★ ★
psianka czarna	★ ★ ★
tobołki polne	★ ★ ★
rdest plamisty	★ ★
rdest ptasi	★ ★
rdest kolankowaty	★ ★
mlecz polny	★ ★ ★

Chwasty	Torero 500 SC
jasnota różowa	★ ★ ★
jasnota purpurowa	★ ★ ★
maruna bezwonna	★ ★
rumian polny	★ ★
kurzyślad polny	★ ★ ★
gwiazdnica pospolita	★ ★ ★
przetacznik perski	★ ★ ★
rzepak ozimy samosiewy	★ ★
chwasznica jednostronna	★ ★
fiolatek polny	★ ★ ★

★ ★ ★ chwasty wrażliwe ★ ★ chwasty średnio wrażliwe

Torero 500 SC – pełna elastyczność aplikacji

Wybierając system ochrony buraków cukrowych przed zachwaszczeniem oraz używane w systemie herbicydy należy uwzględnić:

- występujące chwasty,
- fazy rozwojowe chwastów i buraków cukrowych,
- warunki glebowo-klimatyczne,
- aktualne warunki pogodowe,
- warunki techniczno-organizacyjne.

Torero 500 SC to najlepszy początek ochrony herbicydowej buraków cukrowych. Zalecany jest głównie do stosowania po siewie buraków.


Zalecana dawka: Torero 500 SC 2 l/ha.

Pozostałe zabiegi po wschodach buraków należy wykonywać zgodnie z zaleceniami, odpowiednio do występującego zachwaszczenia, stosując mieszaniny zbiornikowe, np.:

Goltix® 700 SC + Belvedere Forte® 400 SE
(fenmedifam 100 + desmedifam 100 + etofumesat 200)


Goltix 700 SC + Powertwin® 400 SC
(fenmedifam 200 + etofumesat 200)

Goltix 700 SC + Belvedere® 320 SE
(fenmedifam 160 + desmedifam 160)



Torero 500 SC może być stosowany w systemie dawek dzielonych przez cały okres ochrony buraków cukrowych. Pozostałe zabiegi po wschodach buraków w systemie dawek dzielonych można wykonywać stosując Torero 500 SC w mieszaninie zbiornikowej z Belvedere 320 SE.

Zalecana dawka: Torero 500 SC 2 l/ha.





ZESKANUJ KOD



Zadzwoń do doradcy!

REGION 1

Paweł Szrajner, tel. 504 242 453
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 1 Wiktoria Wiśniewska, tel. 501 983 481
- 2 Arkadiusz Sojka, tel. 517 189 746
- 3 Mariola Redzimska, tel. 695 290 205

REGION 2

Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 4 Sławomir Koszuda, tel. 504 242 591
- 5 Diana Podoba, tel. 504 242 576
- 6 Aleksandra Sowińska, tel. 695 290 966

REGION 3

Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 7 Krzysztof Łukaszczyk, tel. 517 189 726
- 8 Mikołaj Ciesielski, tel. 798 685 185
- 9 Łukasz Wiśniewski, tel. 504 242 642

REGION 4

Daniel Piech, tel. 504 242 573
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 10 Andrzej Stoń, tel. 517 189 749
- 11 Mariusz Dołba, tel. 504 242 546

REGION 5

Waldemar Mendel, tel. 504 242 509
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 12 Jakub Nowakowski, tel. 517 189 763
- 13 Remigiusz Waligóra, tel. 504 242 548
- 14 Wojciech Przybyś, tel. 504 242 497



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.