Aminopielik D Maxx® 430 EC

Maksimum szybkości, maksimum mocy!



NOWOŚĆ!

herbicyd – 2,4-D ester, dikamba

ADAMA

Natura i często my sami stwarzamy sytuacje, gdy potrzebny jest herbicyd, który zadziała błyskawicznie.

ADAMA Polska proponuje coś specjalnego na takie okazje: nowy produkt Aminopielik D Maxx 430 EC, który potrafi dawać widoczne efekty już po kilku godzinach od zastosowania i jest skuteczny na cały szereg uciążliwych chwastów dwuliściennych.

Aminopielik D Maxx 430 EC:

- błyskawiczny efekt chwastobójczy,
- dwa regulatory wzrostu w jednym produkcie,
- zwalcza uciążliwe chwasty dwuliścienne w zbożach,
- wygodny termin stosowania,
- brak zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Aminopielik D Maxx 430 EC – błyskawiczny efekt chwastobójczy

Aminopielik D Maxx 430 EC dzięki połączeniu sił dwóch regulatorów wzrostu daje szybki efekt chwastobójczy, widoczny już po kilku dniach.

Rumian polny – efekty działania Aminopielik D Maxx 430 EC

kontrola



Aminopielik D Maxx 430 EC – 8 dni po zabiegu



1,5 l/ha

Mak polny – efekty działania Aminopielik D Maxx 430 EC

kontrola



Aminopielik D Maxx 430 EC – 8 dni po zabiegu



1,5 l/ha

Aminopielik D Maxx 430 EC najskuteczniej niszczy chwasty we wczesnych fazach wzrostu. Większość wrażliwych chwastów dwuliściennych skutecznie zwalczana jest do fazy 4-6 liści, a przytulia czepna do fazy 3-4 okółków.





Aminopielik D Maxx 430 EC – dwa regulatory wzrostu w jednym produkcie

dikamba 54 g/l

Aminopielik D Maxx 430 EC

2,4-D ester 376 g/l

Dikamba należy do grupy herbicydów – regulatorów wzrostu. Ta substancja czynna pobierana jest głównie przez liście.

Dikamba zakłóca prawidłowe funkcjonowanie tkanek odpowiedzialnych za wzrost oraz rozwój chwastów wrażliwych. Już po kilku dniach od aplikacji roślina zostaje pozbawiona asymilatów i „głoduje".

2,4-D to herbicyd należący do grupy syntetycznych auksyn – hormonów roślinnych. Najskuteczniej pobierany jest przez liście roślin.

Efektem działania 2,4-D jest nierównomierny wzrost zwalczanych roślin, prowadzący do deformacji pędów i liści. Objawy te są widoczne na najmłodszych częściach roślin wkrótce po zastosowaniu preparatu.

Całkowite zniszczenie chwastów następuje zwykle po kilku tygodniach.

Aminopielik D Maxx 430 EC zwalcza wiele chwastów dwuliściennych w uprawie zbóż



bodziszek drobny



rdest plamisty



samosiewy rzepaku



jasnota purpurowa



jasnota różowa



komosa biała



rdest powojowaty



rdest ptasi



tasznik pospolity



tobołki polne



żółtlica drobnokwiatowa

ADAMA


gwiazdnica pospolita


mak polny


maruna bezwonna


niezapominajka polna


ostrożeń polny


rzodkiew świrzepa


przytulia czepna


przetacznik bluszczykowy

Zestawienie wrażliwości chwastów dwuliściennych na Aminopielik D Maxx 430 EC

Wrażliwość chwastów dla dawki maksymalnej 1,5 l/ha po zastosowaniu na chwasty w fazie 4-6 liści, przytulia czepna 3-4 okółki.

Chwasty	Aminopielik D Maxx 430 EC
rumian polny	★★★
samosiewy rzepaku	★★★
tasznik pospolity	★★★
komosa biała	★★★
ostrożeń polny	★★★
żołtlica drobnokwiatowa	★★★
bodziszek drobny	★★★
tobołki polne	★★★
jasnota różowa	★★★
jasnota purpurowa	★★★
mak polny	★★
rdest ptasi	★★★
rdest powojowaty	★★★
rdest plamisty	★★★
przytulia czepna	★★★
maruna bezwonna	★★★
niezapominajka polna	★★
gwiazdnica pospolita	★★★

★★★ wrażliwe ★★ średnio wrażliwe

1,0-1,25 l/ha
Niższe dawki Aminopielik D Maxx 430 EC stosować tylko do zwalczania chwastów znajdujących się w początkowych fazach rozwojowych: faza siewek – 2 liście właściwe (BBCH 10-12).

1,5 l/ha
Wyższe dawki Aminopielik D Maxx 430 EC stosować w późniejszych fazach rozwojowych chwastów, maksymalnie 6 liści (BBCH 16), a przytulia czepna maksymalnie w fazie 4 okółków (BBCH 14).


Wyższe dawki Aminopielik D Maxx 430 EC stosować również, gdy w czasie zabiegu oraz bezpośrednio po zabiegu występują niskie temperatury.

Aminopielik D Maxx 430 EC – wygodny termin stosowania w wielu zbożach ozimych i jarych

Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszej fazie rozwojowej zbóż (BBCH 28-29).

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara.

Aminopielik D Maxx 430 EC stosować od początku do końca fazy krzewienia zbóż.
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.



Aminopielik D Maxx 430 EC stosujemy w temperaturze powietrza od 8°C

Spadki temperatur poniżej 5°C w kilka dni po zabiegu mogą wpłynąć na obniżenie skuteczności środka.



Przeciwwskazania

Środka nie stosować:

- w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,
- po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w czasie nadmiernej suszy,
- nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem.

Aminopielik D Maxx 430 EC – brak zagrożenia dla roślin uprawianych następczo

Aminopielik D Maxx 430 EC rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej preparatem Aminopielik D Maxx 430 EC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

ZESKANUJ KOD

Zadzwoń do doradcy!



REGION 1

Paweł Szrajner, tel. 504 242 453
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

1. **Wiktoria Wiśniewska**, tel. 501 983 481
2. **Arkadiusz Sojka**, tel. 517 189 746
3. **Mariola Redzimska**, tel. 695 290 205

REGION 2

Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

4. **Sławomir Koszuda**, tel. 504 242 591
5. **Diana Podoba**, tel. 504 242 576
6. **Aleksandra Sowińska**, tel. 695 290 966

REGION 3

Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

7. **Krzysztof Łukaszczyk**, tel. 517 189 726
8. **Mikołaj Ciesielski** , tel. 798 685 185
9. **Łukasz Wiśniewski**, tel. 504 242 642

REGION 4

Daniel Piech, tel. 504 242 573
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

10. **Andrzej Stoń**, tel. 517 189 749
11. **Mariusz Dołba**, tel. 504 242 546

REGION 5

Waldemar Mendel, tel. 504 242 509
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

12. **Jakub Nowakowski**, tel. 517 189 763
13. **Remigiusz Waligóra**, tel. 504 242 548
14. **Wojciech Przybyś**, tel. 504 242 497

ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e–mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska