

NAWÓZ WE

FORTIS PK 17-47 to nawóz o wysokiej zawartości potasu oraz fosforu. Stosowany we wszystkich gatunkach roślin uprawnych w celu uzupełnienia potasu i fosforu.

FORTIS®

PK 17-47

NAWÓZ WE
(C.2.13.) Roztwór nawozowy PK 10,5/29,0
FORTIS PK 17-47

Nawóz fosforowo-potasowy

Nawóz przeznaczony do stosowania we wszystkich gatunkach roślin uprawnych w celu zapobiegnięcia stratom powstałym w warunkach niedoboru lub nadmiaru wody, polepszenia jakości i ilości plonu wzmaga kwitnienie, zwiększenia zawartości skrobi, cukru i białka, zapobiega wyleganiu i polepsza warunki przechowywania.

Instrukcja stosowania

Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania pozakrzewieniowego w formie oprysku lub przez zraszacze systemów nawadniających. **FORTIS PK 17-47** może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego.

Sporządzanie roztworu roboczego.

Przy włączonym mieszadle, w zbiorniku opryskiwacza wypełnionym do połowy wodą, kolejno rozpuszczać **FORTIS PK 17-47** i inny nawóz dolistny i pestycyd. Gotowy roztwór należy zużyć do kilku godzin od jego sporządzenia. Zaleca się dawkować **FORTIS PK 17-47** zgodnie z informacjami z tabeli. Pozostałe składniki roztworu roboczego należy dawkować zgodnie z zaleceniami ich pro-

ducentów, w dolnej zalecanej dawce.

Środki ostrożności

Nie spożywać! W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W wypadku zanieczyszczenia oczu skontaktować się z lekarzem. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronna. Przestrzegać zasad higieny.

Instrukcja przechowywania

Przechowywać w suchym magazynie w temp. od +5 do +30°C. W przypadku rozlania wytrzeć stosując środki ochrony indywidualnej a powierzchnie spłukać wodą.

Data ważności/nr partii/masa netto:

na opakowaniu

Składniki	g/l	% (m/m)
Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅)	160	10,5
Tlenek potasu (K ₂ O)	444	29

Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie.

Zgodnie z WE 1272/2008.

Zawiera: wodorotlenek potasu.

Może powodować korozję metali.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/ o odpornej powłoce wewnętrznej.



UN 1814

Niebezpieczeństwo



INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLSZYSTOK
Tel. + 48 32 64 55 900
e-mail: intermag@intermag.pl
www.intermag.pl

Roślina	Termin stosowania	Dawka l/ha
Zboża ozime	Jesień: od 4 liści - zwiększanie zimotrwałości i odporności na stresy	2-3
	Wiosna: koniec krzewienia I kolanko - zwiększanie szytywności źdźbła, poprawienie zdrowotności roślin	2-3
	I kolanko do końca pąka a kłoszenia - zapobieganie stresowi spowodowanemu suszą, zapobieganie niedoborom P i K, lepsze wykorzystanie nawożenia azotowego, poprawienie zdrowotności roślin	3-4
	Liść flagowy początek kłoszenia - polepszanie jakości ziarniaków, zwiększanie zawartości białka	2-3
Zboża jare	Koniec krzewienia I kolanko - zwiększanie szytywności źdźbła, poprawienie zdrowotności roślin	2-3
	I kolanko do końca kłoszenia - zapobieganie stresowi spowodowanemu suszą, zapobieganie niedoborom P i K, lepsze wykorzystanie nawożenia azotowego, poprawienie zdrowotności roślin	3-4
	Liść flagowy początek kłoszenia - polepszanie jakości ziarniaków, zwiększanie zawartości białka	2-3
Rzepak ozimy	Jesień : powyżej 4 liści - zagęszczanie soku komórkowego- zwiększenie zimotrwałości	2-3
	Wiosna: faza zielonego pąka - poprawianie wykorzystania azotu, zwiększanie ilości tłuszczyn, zwiększanie zaolejenia	
Burak cukrowy	Zwieranie rzędów - zwiększanie odporności na choroby, zwiększanie odporności na stres suszowy, zwiększanie zawartości cukru	2-4
	Zabieg łączony z zabiegiem na chwościka - zwiększanie odporności na choroby, zwiększanie odporności na stres suszowy, zwiększanie zawartości cukru	2-3
Kukurydza	Od 4 liścia do wiechowania - zwiększenie odporności na stres suszowy, wypełnienie kolby	2-4
Strączkowe	6 liści - kwitnienia - zapobieganie i likwidowanie niedoborów, rozwój systemu korzeniowego	2-4
Ziemniak	Od 15 cm do kwitnienia - ograniczenie stresu suszowego, zapobieganie niedoborom	2-4
	Po kwitnieniu - zwiększenie zawartości skrobi, zwiększenie jakości i smakowości bulw, ograniczenie stresu suszowego, poprawianie zdrowotności	

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.