

NAWÓZ WE

**FORTIS PK 30-30** to nawóz o zrównoważonej zawartości potasu i fosforu. Stosowany we wszystkich gatunkach roślin uprawnych w celu uzupełnienia potasu i fosforu.

# **FORTIS®**

## ***PK 30-30***

**20l**

**NAWÓZ WE**  
(C.2.13.) Roztwór nawozowy PK 19,5/20,5

**FORTIS PK 30-30**

**Zrównoważony nawóz fosforowo-potasowy**

Nawóz przeznaczony do stosowania we wszystkich gatunkach roślin uprawnych w celu zapobiegnięcia stratom powstałym w warunkach niedoboru lub nadmiaru wody, polepszenia jakości i ilości plonu wzmacnia kwitnienie, zwiększenia zawartości skrobi, cukru i białka, zapobiega wyleganiu i polepsza warunki przechowywania.

**Instrukcja stosowania**

Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania pozakorzeniowego w formie oprysku lub przez zraszacz systemów nawadniających.

**FORTIS PK 30-30** może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego.

**Sporządzanie roztworu roboczego.**

Przy włączonym mieszadłe, w zbiorniku opryskiwacza wypełnionym do połowy wodą, kolejno rozpuszczać **FORTIS PK 30-30** i inny nawóz dolistny i pestycyd. Gotowy roztwór należy zużyć do kilku godzin od jego sporządzania. Zaleca się dawkować **FORTIS PK 30-30** zgodnie z informacjami z tabeli. Pozostałe składniki roztworu roboczego należy dawkować zgodnie z zaleceniami ich producentów, w dolnej zalecanej dawce.

**Środki ostrożności.**

**Nie spożywać!** W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W wypadku zanieczyszczenia oczu skontaktować się z lekarzem. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronna. Przestrzegać zasad higieny.

**Instrukcja przechowywania**

Przechowywać w suchym magazynie w temp. od +5 do +30°C. W przypadku rozlania wytrzeć stosując środki ochrony indywidualnej a powierzchnie splukać wodą.

**Data ważności/nr partii/masa netto:**  
na opakowaniu

| Składniki                                             | g/l | %<br>(m/m) |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| Pięciotlenek fosforu (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 280 | 19,5       |
| Tlenek potasu (K <sub>2</sub> O)                      | 295 | 20,5       |

Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie.

**Okres przydatności do stosowania:**  
2 lata od daty produkcji



**INTERMAG**  
INTERMAG sp. z o.o.  
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ  
Tel. + 48 32 64 55 900  
e-mail: intermag@intermag.pl  
www.intermag.pl

| Roślina          | Termin stosowania                                                                                                                                              | Dawka<br>l/ha |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zboża<br>ozime   | <b>Jesień: 2-4 liście</b> - zwiększenie masy korzeniowej, poprawianie zimotrwałości i zdrowotności                                                             | 2-3           |
|                  | <b>Wiosna: 4 – pełnia krzewienia</b> - dokrzewianie roślin, usztywnianie, zwiększanie odporności                                                               | 2-4           |
|                  | <b>I kolanko – liść flagowy</b> - zapobieganie stresowi suszowemu i herbicydowemu, zapobieganie redukcji kłosa, wzmacnianie odporności na choroby              | 2-3           |
|                  | <b>Cały okres wegetacji</b> – odbudowa korzeni po stresie wodnym lub herbicydowym                                                                              | 2-4           |
| Zboża<br>jare    | <b>Liść flagowy – kłoszenie</b> - poprawianie jakości plonu, utrzymanie liczby opadania, zwiększanie siły i energii kielkowania, zwiększanie zawartości białka | 2-3           |
|                  | <b>I kolanko – liść flagowy</b> – zapobieganie stresowi suszowemu i herbicydowemu, zapobieganie redukcji kłosa, wzmacnianie odporności na choroby              | 2-3           |
|                  | <b>Cały okres wegetacji</b> - odbudowa korzeni po stresie wodnym lub herbicydowym                                                                              | 2-4           |
| Rzepak<br>ozimy  | <b>Liść flagowy</b> - poprawianie jakości plonu, utrzymanie liczby opadania, zwiększanie siły i energii kielkowania, zwiększanie zawartości białka             | 2-3           |
|                  | <b>Jesień: od 2 liści</b> - ukorzenianie, zwiększanie zimotrwałości, przyspieszanie rozwoju                                                                    | 2-3           |
|                  | <b>Wiosna: początek wegetacji wiosennej</b> - odbudowa systemu korzeniowego                                                                                    | 2-4           |
|                  | <b>Tworzenie pędu głównego</b> - zwiększenie ilości kwiatów, rozbudowa systemu korzeniowego                                                                    | 1-3           |
| Burak<br>cukrowy | <b>Zielony pąk</b> - zwiększanie pylenia i ilości kwiatów na pędach bocznych                                                                                   | 1-3           |
|                  | <b>6-8 liści</b> - rozrost systemu korzeniowego, likwidowanie niedoborów                                                                                       | 1-3           |
|                  | <b>Zwieranie rzędów</b> - zwiększanie odporności na choroby, zwiększanie odporności na stres suszowy, zwiększanie zawartości cukru                             | 2-4           |
| Kukurydza        | <b>Zabieg łączony z zabiegiem na chwościka</b> - zwiększanie odporności na choroby, zwiększanie odporności na stres suszowy, zwiększanie zawartości cukru      | 1-3           |
|                  | <b>Od 4 liścia do wiechowania</b> - zwiększenie odporności na stres suszowy, wypełnienie kolby, likwidacja niedoborów, zwiększanie ukorzenienia                | 2-4           |
| Strączkowe       | <b>6 liści - kwitnienie</b> - zapobieganie i likwidowanie niedoborów, rozwój systemu korzeniowego, ograniczenie stresu suszowego                               | 2-4           |