

NAWÓZ WE

FORTIS PK 50-12 to nawóz o wysokiej zawartości fosforu oraz potasu. Stosowany we wszystkich gatunkach roślin uprawnych w celu uzupełnienia fosforu i potasu.

FORTIS®

PK 50-12

NAWÓZ WE

(C.2.13.) Roztwór nawozowy PK 34,7/8,8

FORTIS PK 50-12

Nawóz fosforowo-potasowy

Nawóz stosowany we wszystkich gatunkach roślin uprawnych w celu zapobiegania niedoborom, zwiększenia kwitnienia, odbudowy lub rozbudowy systemu korzeniowego.

Instrukcja stosowania

Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania pozakorzeniowego w formie oprysku lub przez zraszacze systemów nawadniających. **FORTIS PK 50-12** może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego.

Sporządzanie roztworu roboczego.

Przy włączonym mieszadle, w zbiorniku opryskiwacza wypełnionym do połowy wodą, kolejno rozpuszczać **FORTIS PK 50-12** i inny nawóz dolistny i pestycyd. Gotowy roztwór należy zużyć do kilku godzin od jego sporządzenia. Zaleca się dawkować **FORTIS PK 50-12** zgodnie z informacjami z tabeli. Pozostałe składniki roztworu roboczego należy dawkować zgodnie z zaleceniami ich producentów, w dolnej zalecanej dawce.

Środki ostrożności

Nie spożywać! W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W wypadku zanieczyszczenia oczu skontaktować się z lekarzem. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronna. Przestrzegać zasad higieny.

Instrukcja przechowywania

Przechowywać w suchym magazynie w temp. od +5 do +30°C. W przypadku rozlania wytrzeć stosując środki ochrony indywidualnej a powierzchnie spłukać wodą.

Data ważności/nr partii/masa netto:
na opakowaniu

Składniki	g/l	% (m/m)
Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅)	486	34,7
Tlenek potasu (K ₂ O)	124	8,8

Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie.

Okres przydatności do stosowania:

2 lata od daty produkcji

Zgodnie z WE 1272/2008.
Zawiera: kwas fosforowy 35%

Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/ o odpornej powłoce wewnętrznej.



UN 3264

Niebezpieczeństwo



INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ
Tel. + 48 32 64 55 900
e-mail: intermag@intermag.pl
www.intermag.pl



Roślina	Termin stosowania	Dawka l/ha
Zboża ozime	Jesień: 2-4 liście - zwiększenie masy korzeniowej, poprawianie zimotrwałości i zdrowotności	2-3
	Wiosna: 3 liście - pełnia krzewienia - dokrzewianie słabo rozkrzewionych roślin, zwiększanie masy korzeniowej	2-4
	1 kolanko - liść flagowy - zwiększanie odporności roślin na choroby, zwiększanie wykorzystania azotu, zapobieganie redukcji kłosa, polepszanie zapylania	3-4
	Cały okres wegetacji - odbudowa korzeni po stresie wodnym lub herbicydowym	2-4
	Liść flagowy - kłoszenie - poprawianie jakości plonu, utrzymanie liczby opadania, zwiększanie siły i energii kiełkowania	2-4
Zboża jare	1 kolanko - liść flagowy - zwiększanie odporności roślin na choroby, zwiększanie wykorzystania azotu, zapobieganie redukcji kłosa, polepszanie zapylania	3-4
	Cały okres wegetacji - odbudowa korzeni po stresie wodnym lub herbicydowym	2-4
	Liść flagowy - kłoszenie - poprawianie jakości plonu, utrzymanie liczby opadania, zwiększanie siły i energii kiełkowania	
Rzepak ozimy	Jesień : od 2 liści - ukorzenianie, zwiększanie zimotrwałości, przyspieszanie rozwoju	2-3
	Wiosna: początek wegetacji wiosennej - odbudowa systemu korzeniowego	2-4
	Tworzenie pędu głównego - zwiększenie ilości kwiatów, rozbudowa systemu korzeniowego Zielony pąk - zwiększanie pylenia i ilości kwiatów na pędach bocznych	1-3
Burak cukrowy	6-8 liści - rozrost systemu korzeniowego, likwidowanie niedoborów Wykonywanie zabiegów na chwościka - zwiększanie skuteczności fungicydów	1-3
Kukurydza	4-10 liści - zapobieganie i likwidowanie niedoborów, rozwój systemu korzeniowego	2-4
Strączkowe	6 liści - kwitnienie - zapobieganie i likwidowanie niedoborów, rozwój systemu korzeniowego	2-4

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.