

**NOWA ULEPSZONA FORMUŁA
SYSTEM A.L.G.**

**NAWÓZ WE
(E.2.4.1.)**

**Mieszanina mikroskładników
pokarmowych:
bor (B) i molibden (Mo)**

FORTIS®
BOR + MOLIBDEN

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH wyrażona w % (m/m):
bor (B) rozpuszczalny w wodzie 11,0% (150 g B w 1 litrze nawozu);
molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,37% (5 g Mo w 1 litrze nawozu);

INSTRUKCJA STOSOWANIA: łatwo przyswajalny nawóz dolistny dla roślin borolubnych. FORTIS B+Mo stosować w postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innym nawozem dolistnym. Można dodać odpowiedni, sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.

PRZYGOTOWANIE CIECZY UŻYTKOWEJ: dawkę nawozu rozcieńczyć w ok. 5 l wody o temp. 18-20°C i wlać do zbiornika opryskiwacza w ½ objętości wypełnionego wodą, przy włączonym mieszadle. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania. Wykonując roztwór kilku nawozów zachować kolejność rozpuszczania: siarczan magnezu, mocznik, FORTIS B+Mo, inny nawóz dolistny, pestycyd.

UPRAWY	Ilość oprysków	Terminy stosowania nawozu	Jednorazowe dawki	
			FORTIS B+Mo [l/ha]	ciecz użytkowa [l/ha]
RZEPAK	jesień 1	faza 4–8 liści	1–1,5	200–300
	wiosna 2	I – ruszenie wegetacji – formowanie łodygi; II – pąkowanie – początek kwitnienia; inny dopuszczalny termin – koniec kwitnienia, w czasie opadania płatków kwiatowych.		
BURAK	2–3	I – faza 4–8 liści właściwych; II – 10–12 liści dobrze rozwiniętych; III – przed zakryciem międzyrzędzi; przy ostrym deficycie boru wykonać 3–4 opryski co 7 dni.		
ZIEMNIAK	2–3	I – formowanie pedów – zwieranie międzyrzędzi; II – tworzenie bulw – tworzenie kwiatostanów; III – kwitnienie – dojrzewanie.		
MOTYLKOWE GRUBONASIEINNE	2	I – faza 7 liści lub po wytworzeniu rozety u lubinów; II – przed kwitnieniem.	1	
MOTYLKOWE DROBNO-NASIEINNE	2	I – 3 tygodnie po ruszeniu wegetacji wiosennej; II – przed kwitnieniem, nie później niż 3 tyg. przed zbiorem paszy.		
KUKURYDZA	2–3	I – faza 2–6 liści; II – 8–10 liści; III – od 12 liści do wyrzuczenia wiech.		
INNE UPRAWY ROLNICZE	1–2	W okresie intensywnego wzrostu, a zwłaszcza w fazach krytycznych decyd. o rozwoju organów generatywnych.	0,5–1,5	
DRZEWIA I KRZEWY OWOCOWE	jesień 2	I – po zbiorach; II – po 10–14 dniach.	1	500–1000
	wiosna 3	I – przed kwitnieniem; II – w czasie opadania płatków kwiatowych; III – dwa tygodnie po zakończeniu kwitnienia.		
WINOROŚL	2	I – początek kwitnienia; II – 7–10 dni później.	1,5	300–600
TRUSKAWKA	2	I – faza białego pąka; II – początek kwitnienia.	1	
POMIDOR, PAPRYKA, OGÓREK	2	I – 2–3 tyg. po wysadzeniu rozsady; II – przed kwitnieniem.		
WARZYWA, ROŚLINY OZDOBNE	3	I – gdy rośliny mają wykształcone 2–6 liści (ok. 3 tyg. po wysadzeniu rozsady); II i III – faza intensywnego wzrostu co 10–14 dni.	0,8	

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU – Nawóz przechowywać w temp. od -3°C do +30°C. Ilość warstw podczas magazynowania i transportu: 3 – pojemniki 5 l. Przy rozlaniu ciecz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Powstały roztwór wykorzystać do nawożenia. Chronić przed dziećmi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie spożywać – w razie spożycia wypić ok. 0,5 l wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu – przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną. Przestrzegać zasad higieny. Termin ważności: 3 lata od daty produkcji.

INTERMAG

Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz, tel. +48 32 64 55 901, fax +48 32 64 27 044
intermag@intermag.pl, www.intermag.pl

FORTIS®
znak zastrzeżony