



LEIMAY® 200 SC

Środek grzybobójczy, w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny, o działaniu ochronnym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania zarazy ziemniaka (*Phytophthora infestans*).

Substancja czynna:

amisulbrom (związek z grupy sulfonamidów) – 200 g w 1 litrze środka (18%)

Zakres stosowania i dawki:

- wszystkie odmiany ziemniaka wczesnego, średnio wczesnego i konsumpcyjnego oraz sadzeniaki

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.


Można wykonać maksymalnie 6 zabiegów na uprawę, stosując do 0,5 litra produktu na hektar, z 7-10-dniowym odstępem między zabiegami.

Pierwszy oprysk należy wykonać jak tylko nastąpi zagrożenie zarazą ziemniaka, czyli w okresie infekcji zarazą ziemniaka (okres Smitha) lub w momencie wydania oficjalnego oświadczenia. W razie braku ostrzeżenia, oprysk preparatem Leimay należy rozpocząć bezpośrednio przed tym, jak liście roślin uprawnych zaczną dotykać się w rzędzie.

W okresie wysokiego nasilenia choroby i szybkiego rozwoju zielonych części ziemniaka należy wykonywać oprysk w odstępie 7 dni. Przy mniejszym nasileniu choroby, zabiegi można powtarzać w maksymalnym odstępie 10 dni. Preparat Leimay może być stosowany na dowolnym etapie programu zabiegów przeciwko zarazie ziemniaka, a ostatni zabieg należy wykonać nie później niż 7 dni przed zbiorem.

Preparat ten może być używany w programie zwalczania zarazy ziemniaka na przemian z innymi środkami grzybobójczymi.

PROGRAM OCHRONY ZIEMNIAKA NUFARM



REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Dział Nasion i Zapraw

Tomasz Przybylski

tel. 603 603 960

tomasz.przybylski@nufarm.com

Dział Doświadczeń

Grzegorz Wieszolek

tel. 609 295 949

grzegorz.wieszolek@nufarm.com

Dział Nawozów Dolistnych

Sławomir Doniec

tel. 603 347 666

slawomir.doniec@nufarm.com

Dział Sprzedaży

tel. 22 654 07 72

fax 22 654 07 82

Nufarm Polska Sp. z o. o.

ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa

tel. +48 22 620-32-52

www.nufarm.pl

Szukaj nas na:

YouTube Nufarm Polska – YouTube

facebook.com/nufarmpolska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



Nufarm

Grow a better tomorrow.

FUNGICYD



LEIMAY® 200 SC

NOWOŚĆ


PIORUNUJĄCO INNY NIŻ WSZYSTKIE




Nufarm

Grow a better tomorrow.


Amisulbrom działa na różne stadia rozwojowe patogenu – *Phytophthora infestans*, wywołującego zarazę ziemniaka, blokując jego rozwój




Szybkie wchłanianie i wiązanie z warstwą woskową



Porównanie skuteczności w zwalczaniu zarazy ziemniaka (*Phytophthora infestans*) Leimay 200 SC + preparat kontaktowy



Porównanie skuteczności w zwalczaniu zarazy ziemniaka (*Phytophthora infestans*) Leimay 200 SC w kombinacji z różnymi adiuwantami



Wykonano 5 zabiegów w odstępach 7-10-dniowych.

Piotrówek 2017, Agroriseach Sp. Z o.o.

Ocena skuteczności środków przeciwko zarazie ziemniaka (*Phytophthora infestans*)


Produkt	Dawka (litr lub kg/ha)	Skuteczność			Mechanizm działania			Odporność na zmywanie przez deszcz	Działanie w roślinie
		ochrona liści (w skali 2-5)	ochrona łodygi	ochrona bulw	zapobiegawczy	lecniczy	antysporulacyjny		
amisulbrom + mankozeb	0.5 + 2.0	4.5	+	++(+)	++(+)	0	?	+++	kontaktowe + kontaktowe
cyjazofamid	0.5	3.5	+	++(+)	+++	0	0	+++	kontaktowe
initium + mankozeb	2.5	3.6	?	++	++(+)	0	0	+++	kontaktowe + kontaktowe
propamokarb + cymoksanil	2.0	?	?	?	++(+)	++(+)	++(+)	?	systemiczne + translaminarne

+ dostateczny efekt, ++ dobry efekt, +++ bardzo dobry efekt, ? brak doświadczeń

Bardzo skuteczny – w testach Euroblight osiągnął najwyższy wynik ochrony liści i bulw (w mieszaniu z mankozebem).



Koncentracja substancji czynnej i blokowanie uwalniania zoosporów na powierzchni liścia ziemniaka




Długotrwałe działanie zapobiegawcze – do 28 dni po zabiegu!

Rozwój porażenia na liściu – *Phytophthora*


Wieloletnie doświadczenia wdrożeniowe w Holandii.

Wykonano 5 zabiegów w odstępach 7-10-dniowych.




Porównanie skuteczności fungicydów w zwalczaniu zarazy ziemniaka, ocena w fazie BBCH powyżej 70.

Skuteczność działania środków ochrony roślin w zwalczaniu zarazy ziemniaka na liściach, UP Poznań 2016. Ocena 16.08.2016 (BBCH 70-77)



Skuteczność działania środków ochrony roślin w zwalczaniu zarazy ziemniaka na pędach, UP Poznań 2016. Ocena 29.08.2016 (BBCH 70-77)



Doświadczenie z ziemniakami odmiany Vineta z dodatkowym zabiegiem fungicydowym preparatem Leimay 200 SC, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, Sulejów 2017

Kombinacja	Plon w kg/pol.	Plon w dt/ha	% frakcja bulw pow. 60 mm	% frakcja bulw 51-60 mm	% frakcja bulw 36-50 mm	% frakcja bulw do 35 mm	% skrobi
4 powtórzenia							
standardowy program	90,7	407,1	41,2	37,6	20,8	0,4	14,2
dodatkowo z opryskiem Leimay 200SC	91,6	411,1	61,9	24,4	13,1	0,6	14,3



Grow a better tomorrow.