

Posiadacz zezwolenia: Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf,
Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 211 13066 860, fax: +49 211 328231

Producent: Nippon Soda Co Ltd,
Shin-Ohtemachi Building, 2-1, 2-Chome, Ohtemachi, Chioda-Ku, Tokyo, 100-8165 Japonia,
tel.: +813 3245 6268, fax: +813 3245 6287

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl; www.sumiagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:

1. AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów,
tel.: +48 62 78 32 000, fax: +48 62 78 44 445; e-mail: agrecol@agrecol.pl, www.agrecol.pl
2. Agropak Sp. J., B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno,
tel.: +48 32 61 56 918, fax: +48 32 61 56 330,
e-mail: agropak@agropak.pl, www.agropak.com.pl
3. BROS Sp. J., B. P. Miranowscy, ul. Karpia 24, 61-619 Poznań,
tel.: +48 61 82 62 512, fax: +48 61 82 00 841, e-mail: biuro@bros.pl, www.bros.pl
4. SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J.,
ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las,
tel.: +48 61 29 72 600, +48 61 81 25 113; fax: +48 61 29 72 602;
e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
5. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa,
tel.: +48 58 77 41 090, fax: +48 58 67 67 489, e-mail: info@target.com.pl, www.target.com.pl
6. Zakład Produkcyjno - Handlowy "Agromix" Roman Szewczyk,
ul. Mokra 7; 32-005 Niepołomice,
tel.: +48 12 281-1008; fax: +48 12 281-1453
e-mail: agromix@agromix.com.pl, www.agromix.com.pl
7. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa,
tel.: +48 58 552 00 27 do 29, fax: +48 58 552 48 31,
e-mail: fregata@fregata.gda.pl, www.fregata.gda.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

***MOSPILAN 20 SP**

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów - 20 %

Zezwolenie MRiRW Nr R-37/2008 z dnia 29.04.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-82/2009d z dnia 11.05.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-14/2010d z dnia 21.01.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R-35/2011d z dnia 04.02.2011 r.,
decyzją MRiRW nr R-123/2012d z dnia 05.06.2012 r.
decyzją MRiRW nr R-82/2014d z dnia 13.03.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-285/2014d z dnia 08.08.2014 r.

znaki ostrzegawcze:
GHS07 - Wykrzyknik
GHS09 - Środowisko

UWAGA

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P102 Chronić przed dziećmi.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować odzież ochronną.
P 301 + P 312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P391 Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

MOSPILAN 20 SP jest środkiem owadobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, roślinach sadowniczych, warzywnych, ozdobnych.
Środek MOSPILAN 20 SP stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

STOSOWANIA ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

ziemniak

- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 g/100 m²

Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.

Zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ROŚLINY SADOWNICZE

jabłoń

- mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

- toczyk gruszoziemek

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg wykonać od fazy różowego pąka do końca opadania płatków kwiatowych.

- owocówka jabłkoweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni

Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj.

- owocnica jabłkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, w fazie opadania płatków kwiatowych.

- przyszczarek jabłoniak

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).

- ogrodnica niszczylistka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).

- bawełnica korówka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Zalecana dawka: Mospilan 20 SP 2,0 g/100 m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc (powyżej BBCH 56).

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2

wiśnia i czereśnia

- nasionnica trześniówka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawiania się muchówek i masowego składania jaj.

W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów środkami należącymi do innych grup chemicznych.

- mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Mospilan 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 1,25 g/100 m² + adiuwanta Slippa 1 ml/100 m²

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2

grusza

- owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub w fazie rozwoju jaj "czarna główka".

- mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2

śliwa

- mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Mospilan 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Zalecana dawka: Mospilan 20 SP 1,25 g/100 m² + adiuwanta Slippa 1,0 ml/100 m²

- owocnice śliwowe

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych.

- owocówka śliwkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 2-3 tygodnie

Środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj na każde pojawiające się pokolenie szkodnika.

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2

truskawka

- opuchlaki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 g/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 g/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

ROŚLINY SADOWNICZE

grusza

- zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

- miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Zabieg wykonać od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 11-71).

Środek ogranicza występowanie osobników dorosłych i larw pierwszego pokolenia.

- śluzownica ciemna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

- kwiecień gruszowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

- przyszczarek gruszowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Środek stosować w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

śliwa

- zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

- misecznik śliwowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować na początku żerowania szkodników od fazy zielonego pąka do fazy białego pąka śliwy (BBCH 54-59).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.=

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

wiśnia, czereśnia

- zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

- śluzownica ciemna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

- licinek tarninaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

- kwieciek pestkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg wykonywać w okresie występowania chrząszczy od fazy pąka białego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

morela, brzoskwinia

-zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

- mszyce

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

winorośl

- zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

- mszyce

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

- ogrodnica niszczylistka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

borówka amerykańska

- zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

- mszyce

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

- ogrodnica niszczylistka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89).

- przyszczarek borówkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni

Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na liściach od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0-7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

leszczyna

- mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2-7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

malina

- mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

- krzywik maliniaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować w okresie pęknięcia pąków (BBCH 56-59).

- kwieciek malinowiec, kistnik malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się chrząszczy, przed kwitnieniem, gdy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

- przyszczarek namalinek łądgowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać w okresie lotu muchówek, od fazy gdy jest rozwinięty pierwszy liść do fazy gdy pędy osiągają około 90 % typowej długości lub po zbiorze owoców (BBCH 11-39 lub BBCH powyżej 89). Opryskiwać dokładnie dolne części pędów.

- przeziernik malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Opryskiwać po zbiorze owoców (BBCH powyżej 89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała

- mszyce, zwójka siatkoweczka, zwójka różoweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

- krzywik porzeczkwiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)

- przyszczarek porzeczkwiaak liściowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

- owocnica porzeczkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia gdy jest około 10 % rozwiniętych kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 61-69).

- przeziernik porzeczkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

agrest

- mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

- przeziernik porzeczkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

truskawka

- kwieciak malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni

Opryskiwać w okresie pojawienia się chrząszczy, w fazie rozwoju kwiatostanu kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

- zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać w okresie pojawienia się szkodnika, w fazie rozwoju kwiatostanu kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE W GRUNCIE

papryka

- wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

- mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 11-85).

- śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

- zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2- 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

dynia, melon, kawon

- wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

- zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

ogórek

- wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

- śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

- zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2- 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

czosnek

- mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy gdy pierwsze torebki pękają (BBCH 11-85).

- śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2- 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

sałata

- mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy 50% owoców lub 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

szpinak

- mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy 50% owoców lub 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

- śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

bób

- strąkowiec bobowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać od fazy 3 liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-70).

- śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

groch, fasola

- strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać od fazy 3 liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-70).

- śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

- wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

burak ćwikłowy

- pchełka burakowa, drobnica burakowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych szkodników od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy 9-ciu liści właściwych (BBCH 11-19).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

por

- chowacz szczypiorak, młode gąsiennice wgryzki szczypiórki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy 1 liścia właściwego, nie później niż do momentu osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11-48).

- wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

- śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

cebula

- chowacz szczypiorak, młode gąsiennice wgryzki szczypiórki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy 1 liścia właściwego, nie później niż do momentu osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11-48).

- wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

- śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

- mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy 50 % owoców lub 50 % nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

kapusta głowiasta

- pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80 % docelowej masy główki (BBCH 13-48).

- wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

kapusta brukselska, kapusta pekińska

- wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mospilan 20 SP 2,0 g/100m² + Slippa 2,0 ml/100 m²

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

- pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80 % docelowej masy główki (kapusta pekińska) lub do fazy osiągnięcia 80 % rozgałęzień mocno zamkniętych (kapusta brukselska) (BBCH 13-48).

- śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

- mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Środek stosować od fazy gdy pierwszy liść właściwy jest rozwinięty do fazy osiągnięcia połowy docelowej masy główek i liści (BBCH 11-48).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

fasola

- zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2,0 - 5,0 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

pomidor

- skoczogonki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Środek stosować od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia na pędzie głównym do 9-ciu rozwiniętych liści na pędzie głównym (BBCH 11-19).

- mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m²

Liczba zabiegów: 1

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 11-85).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI

ogórek, pomidor, papryka, oberżyna, sałata

- mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmieniki, pchełki

Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:

0,04 % tj. 4 g środka w 10 litrach wody

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:

0,04 % tj. 4 g środka w 10 litrach wody

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Zalecana ilość wody w uprawie roślin warzywnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych:
3-20 l/100 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE W GRUNCIE I POD OSŁONAMI

- mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki

Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:

0,04 % tj. 4 g środka w 10 litrach wody

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:

0,04 % tj. 4 g środka w 10 litrach wody

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych:
3- 20 l/100 m²

Uwagi:

1. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamipryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka Mospilan 20 SP zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszało hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, w przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia następujących upraw: rzepak ozimy, rośliny sadownicze, rośliny warzywne i ozdobne w celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środki zaleca się stosować poza okresem ich aktywności na plantacji.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie:

- zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha;
- zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwini, truskawki, bobu, fasoli, grochu, cebuli, czosnku, papryki, pora, sałaty, szpinaku, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, kapusty brukselki, dyni, melona, kawona;
- zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie agrestu, borówki amerykańskiej, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, leszczyny, winorośli;
- zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawianych pod osłonami (typu tunel foliowy) oierzynie, papryce, ogórku, sałacie, w dawce do 0,2 kg/ha;.

W przypadku stosowania środka w uprawianych pod osłonami oierzynie, papryce, ogórku, pomidorze, sałacie, oraz roślinach ozdobnych w dawce od 0,2 kg/ha do 0,8 kg/ha istnieje konieczność zastosowania izolacji od środowiska glebowego i wodnego.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha;
- 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w gruszy, śliwie, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwini;
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w agrestie, borówce amerykańskiej, leszczynie, malinie, porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, winorośli, roślinach ozdobnych uprawianych w gruncie.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZOŁ (OKRES ZAPOBIEGAJĄCY ZATRUCIU): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI): ziemniak - 3 DNI,
rośliny sadownicze i warzywne - 14 DNI,
rośliny ozdobne - NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (OKRES KARENCJI DLA PASZ): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
NIE DOTYCZY.

PIERWSZA POMOC

Antidotum brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, pokaż etykietę).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pod zamknięciem.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Okres ważności - 4 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -