

Producent:

Momentive Performance Materials 3500 South State Route 2, FRIENDLY WV 26146, USA

Dystrybutor:

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: (22) 866 41 80,
fax: (22) 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com.

SILWET Gold

surfaktant- preparat zwilżający i zwiększający przyczepność

Atest Nr PZH/HT-3011/2015

Zawartość substancji aktywnej:

zmodyfikowany polialkilenotlenek heptametylotrisiloksanu

związek z grupy kopolimerów silikono-polieteryowych - 806 g/l

**UWAGA**

Zwroty (H) wskazujące rodzaj zagrożenia:

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty (P) wskazujący środki ostrożności:

P102 - Chronić przed dziećmi.

P301 + P310 + P101 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P305 + P351 + P338 + P313 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Przeznaczenie:

Niejonowy, organosilikonowy surfaktant- preparat zwilżający i zwiększający przyczepność, stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów, herbicydów) i nawozów dolistnych. Redukuje napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej ułatwiając dokładne pokrycie liści i innych części chronionych roślin.

Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

Dawkowanie:

- Uprawy rolnicze
stosować w dawce 0,1 l/ha, przy użyciu 200-300 l wody.
- Uprawy sadownicze, uprawy warzywnicze, rośliny ozdobne
stosować w stężeniu 0,015% (150 ml preparatu na 1000 l wody).

UWAGI:

1. Silwet Gold stosować w cieczy użytkowej o pH 5-8
2. Ciecz użytkową wykorzystać w ciągu 24 godzin po przygotowaniu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przygotować obliczoną ilość środka Silwet Gold zgodnie z zalecanym dawkowaniem.

Napełnić zbiornik wodą w około 2/3 jego pojemności, wlać odmierzoną ilość środka ochrony roślin i dokładnie wymieszać. Uzupełnić wodą do 90% pojemności, dodać odmierzoną ilość preparatu Silwet Gold i mieszać przez 1-2 minuty, uzupełnić wodą do 100 % pojemności i zamieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5° C i nie wyższej niż 30° C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po produkcji zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

Podczas postępowania ze środkami ochrony roślin należy ściśle przestrzegać zapisów zawartych w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -