

Nr pozwolenia: Decyzja MRiRW Nr 540/19 z dnia 26.02.2019 r.

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Zawartość azotu (N) ogółem, co najmniej 9,1 % (m/m)
Zawartość azotu organicznego (N_{org}), co najmniej 8,7 % (m/m)
Zawartość azotu amonowego (N-NH₄), co najmniej 0,4 % (m/m)
Zawartość wolnych aminokwasów (FAA_s), co najmniej 10,0 % (m/m)
Zawartość węgla organicznego (C_{org}), co najmniej 24,0 % (m/m)
Zawartość substancji organicznej, co najmniej 63,0 % (s.m.)

Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100%

Producent:

ISAGRO S.p.A., Caldera Business Park, Via Caldera 21, 20153 Mediolan, Republika Włoska

Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6 B, 01-756 Warszawa; tel: +48 22 866 41 80,
e-mail: sekretariat@arysta.com

AMINOPLANT

Nawóz organiczny

Zakres stosowania

Aminoplant można stosować w uprawach polowych wszystkich gatunków roślin rolniczych, w warzywnictwie i sadownictwie jako nawóz dolistny.

Wielkość dawek nawozu, sposób i terminy stosowania

Zakres stosowania	Termin stosowania	Zalecana dawka
WARZYWA GRUNTOWE	wykonać 3- 4 zabiegi w sezonie co 10-14 dni, pierwszy zabieg wykonać, gdy rośliny wykształcą 5-8 liści	1-1,5 l/ha* lub 0,3%
RZEPAK I INNE ROŚLINY ROLNICZE	Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie, pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, drugi 10-14 dni później	1-1,5 l/ha***
ROŚLINY SADOWNICZE	4-6 zabiegów w sezonie co 10-14 dni, rozpoczynając od fazy opadania płatków kwiatowych	3l/ha**

* Polecaną dawkę nawozu na ha stosować przy 400-600 l wody

** Polecaną dawkę nawozu na ha stosować przy 500-800 l wody

*** Polecaną dawkę nawozu na ha stosować przy 200-400 l wody

AMINOPLANT stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego. Zabieg wykonany rano lub wieczorem powinien zapewnić całkowite zwilżenie liści.

Uwaga:

- Nie przewiduje się łącznego stosowania nawozu ze środkami ochrony roślin.
- Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która zamarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Sposób sporządzania cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Uwaga:

Przed użyciem wstrząsnąć

Odmierzyć potrzebną ilość nawozu, wlać do pojemnika z małą ilością wody i zamieszać. Następnie wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 2/3 jego objętości, przy włączonym mieszadle. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle mieszając. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin.

AMINOPLANT może być mieszany z innymi płynnymi nawozami i chelatami (w przypadku stosowania w mieszaninie AMINOPLANT dodawać do zbiornika jako ostatni, ciągle mieszając).

Przechowywanie nawozu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0°C – 30°C w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Środki ostrożności

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata od daty produkcji.

Masa netto nawozu: