

Posiadacz zezwolenia: Bayer CropScience AG,
Alfred/Nobel - Strasse 50, D - 40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 2173 383 114, fax: + 49 2173 383 570

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03

*AVIATOR XPRO 225 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

protriokonazol (związek z grupy triazoli) - 150 g / 1l (14,90 %),
biksafen (związek z grupy karboksamidów) - 75 g / 1l (7,40 %).

Zezwolenie MRiRW nr R-11/2013 z dnia 17.01.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-512/2015d z dnia 15.06.2015 r.
decyzją MRiRW nr R-36/2016d z dnia 21.01.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-454/2016d z dnia 16.09.2016 r.

znaki ostrzegawcze:

GHS07 - Wykrzyknik

GHS09 - Środowisko

UWAGA

H319- Działa drażniąco na oczy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

EUH401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

EUH 208- Zawiera

2-[2-(1-Chlorocyklopropylo)-2-hydroksy-3-fenylopropylo]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-ti
on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P280- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P 391 -Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

AVIATOR XPRO 225 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

pszenica ozima

- łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew
Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 -1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami - 14 dni

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

pszenica jara

- septorioza paskowana liści

Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 -1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami - 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

pszenżyto ozime

- łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż

Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 -1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami - 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

jęczmień ozimy

- łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa

Środek stosować zapobiegawczo od fazy krzewienia (BBCH 21) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do początków fazy kłoszenia (BBCH 51).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,8 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami - 14 dni

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

jęczmień jary

- łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła (ogranicza występowanie choroby), mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
Środek stosować zapobiegawczo od fazy krzewienia (BBCH 21) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,8 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami - 14 dni

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

żyto

- łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 -1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami - 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwagi:

1. Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą roślinę.
2. Środek stosować nie więcej niż dwa razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co najmniej 14 dniowych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK

Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres przewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary, żyto - 35 DNI.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO UZUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0oC-30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC

Antidotum brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -